

آرٹیں صدری

(Angina)

مجموعه‌ی از اطلاعات برای افرادی که بستایه
آرٹیں صدری تند
برای خانواده و دوستان آنکان

نشریه‌ی معاو قلب انگلستان
ترجم مرضی مدنی تراث

مطلوبی که در این جزوه آورده شده است نمی تواند جایگزین دستورات یاراهمانی هائی شود که پزشک شما با آشنائی کاملی که از وضع جسمانی شما دارد، به شماداده است.

این جزوه برای افرادی که مبتلا به آژین صدری شده اند، و نیز برای دوستان، و افراد خانواده آنان تهیه شده است.

درباره موضوع های زیر گفته شود:-

- آژین صدری چیست

- علت آن چیست

- آزمایش هائی که برای تشخیص آن انجام میدهد

- درمان آژین، که شامل درمان و جراحی نیز می شود

- چه باید کرد، چه باید کرد تا آژین شما از آنچه هست بدتر نشود.

نمرت سه رجات

آژین صدری چیست؟

علت آژین چیست؟

چگونه پزشک آنرا تشخیص میدهد؟

چگونه آژین را درمان میکنند؟

چه میتوانم بکنم تا از حمله آژین جلوگیری کنم؟

زندگی با آژین صدری چگونه میگذرد؟

تغییراتی که باید پزشک خود را از آن آگاه کنید

اصطلاحات فنی

بیاد قلب اسلام

آنژین صدری احساسی ناراحت کننده در قفسه سینه است. معمولاً مثل آن می‌ماند که سینه شما سنگینی می‌کند، یا اینکه درست در وسط سینه خودتان نوعی سفتی یا فشار احساس می‌کنید که ممکن است تا بازوها، گردن، آرواره، صورت، پشت، یا شکم شما کشیده شود. بعضی افراد آن را به دردی گند و گنگ و بعضی دیگر آنرا به دردی سمح تعبیر کرده‌اند. علائم و نشانه‌های این بیماری معمولاً ظرف ده دقیقه کاهش می‌یابد. برای بعضی‌ها این سفتی و انقباض، بسیار حاد و دردناک و برای بعضی دیگریش از یک ناراحتی جزئی نبوده است.

چه زیب خلا آنژین صدری نی شود؟

آنژین، ممکن است در اثر فعالیت‌های بدنی، یا ناراحتی‌های عصبی ظاهر شود. معمولاً هنگامی که شما مشغول راه رفته‌ید ظاهر می‌شود. اگر هوا سرد است، یا آنکه شما پس از خوردن غذا مشغول راه رفته‌ید، همان وقت، ممکن است ماشه آن به سادگی کشیده شود. آن احتمال نیز وجود دارد، زمانی که مشغول استراحتید این کار اتفاق بیفتد. یا حتی ممکن است هنگامی که در خوابید این ماشه کشیده شود.

اگر خل آغاز شد چه یام کرد؟


اگر با حمله آنژین مواجه شدید باید به هر کاری که مشغولید، آنرا رها کنید و به استراحت بپردازید تا این ناراحتی و حمله پایان پابد و درد متوقف شود. هم چنین نیاز به آن دارید که از داروهایی که در دست دارید برای رفع ناراحتی استفاده نمایید. اگر پس از ۱۵ دقیقه هنوز هم آن

سنگینی، یاسفتی را در سینه دارید و آن را احساس می‌کنید باید به پزشک خود اطلاع دهید، و یا اینکه با آمبولانس خود را به بیمارستان برسانید.

علت آنژین صدری پست:

عضله یا ماهیچه قلب، خودش به دریافت خون و اکسیژن و مواد مقوی غذائی نیاز مند است تا بتواند خون را پمپاژ کند و آنرا به تمام نقاط بدن شما برساند. رگهای کورونر قلب، یا عروق، یا شریانها، خون غنی شده با اکسیژن را به ماهیچه قلب می‌رسانند. دو سرخرگ عمدۀ قلب (چپ و راست) بسیاری از اوقات تقسیم می‌شوند تا خون، به تمام دیواره‌های عضلانی قلب برسد.

The heart



این عروق کورونر که وظیفه غذارساندن به قلب را دارند ممکن است در اثر جمع شدن مواد چرب طی سالیان دراز در دیواره داخلی آنها، باریک شوند. به این حالت در زیان پزشکی

بناد قلب انگستان

اَتِرُوْسْکِلِرُوزِيزْ گویند، و به آن مواد چرب که در جدار سرخر گ جمع شده اند «اَتِرُومَا» می‌گویند. در طی زمان این سرخر گ ممکن است باریک و باریک ترشود. به قسمی که دیگر نتواند به اندازه خوراک قلب خون اکسیژن داریه ماهیچه قلب هنگامی که تقاضای آن خون را دارد، تحويل دهد. مثلاً در آن زمانی که شما مشغول تمرين ورزشی هستید. به همین حالت، آنژین صدری گویند. همین موقع است که قلب تشه اکسیژن است و چون به آن نمیرسد آن سفتی و سنگینی را شما در سینه خود احساس می‌کنید. اگر انجام کارهای زیرو عادات و خصائص شما شده است احتمالاً در انتظار «اَتِرومَا» نیز باشید:-

- اگر جزو دسته سیگاری ها هستید.
- اگر فشار خونتان بالاست.
- اگر سطح کلسترول خونتان بالاست.
- اگر به اندازه کافی ورزش نمی کنید.
- اگر دیابت دارید.

فاکتورهای دیگری که درین کاردخالت دارند زیاده از حد تنومندی، چاقی، نوشیدن زیاد تراز حد معمول الكل، و سابقه تاریخی خانوادگی برای سکته قلبی و آنژین صدری داشتن است.

من از کجا باعث ک این حالت آنژین صدری است؟

چه بسیار دردهای سینه که با آنژین صدری بی ارتباط است. دردهای کوتاه، تندوتیز چون خنجر، معمولاً دردهای عضلانی است. درد گنگ و پایدار، که جای آن در زیر پستان چپ ماست معمولاً وقتی ظاهر می‌شود که ماناراحت و عصبانی و یا زیاد واله و مستاقیم. سوه هاضمه نیز می‌باشد.

میتواند در مرکز سینه درد پایا فریند ولی این درد معمولاً به غذا مرتبط می شود و نه ورزش.

فرق بین آنژین صدری و کت قلبی چیز است؟

وقتی سکته قلبی ظاهر می شود که یکی از عروق کورونر قلب که با ریک شده بوده است لخته خونی این راه باریک را مسدود کند. درد سینه‌ی تی که در اثر سکته قلبی به شخص دست میدهد معمولاً شدید تراز آنژین و مدت درد آن نیز طولانی تراست. در سکته، ممکن است شما عرق کنید و حالت استفراغ نیز داشته باشید. قرص نیترات یا افشارنک (اسپری) آن که معمولاً دردهای آنژین را تخفیف میدهد، در سکته کار ساز نیست. علائم شدید سوء‌هاضمه که با داروالتیام نمی‌یابد احتمال دارد سکته قلبی باشد.

چنانچه خصوصیات آنژین صدری چیزی باشد

بسیاری از افراد پس از تمرین‌های ورزشی خاص خودشان مبتلا به آنژین شده‌اند. این نوع آنژین را «آنژین پایدار» می‌گویند. ولی اگر خصوصیات آنژین فرق کند و با تمرین کمتری ظاهر شود، یا حتی هنگامی که شما مشغول استراحتید سر و کله آن پیدا شود، به آن «آنژین ناپایدار» گویند.

اگر نحوه آنژین شما به طریقی که گفته شد تغییر یافتد، آنرا به پزشک خود اطلاع دهید. معمولاً این نوع تغییرات قبل از آنکه سکته قلبی ظاهر شود اتفاق می‌افتد. بنابراین باید فوراً به آن رسیدگی شود و شخص تحت درمان قرار گیرد.

بیاد قلب اکلستان

آثار و علام کنکنی

آثار و علام آژین صدری

سقشی و سنگینی در قسمه سینه که
نمکن است به بازویها، گردن،
آرواره، پشت، و شکم نیز کشانده
شود

ممکن است شخص عرق کند، حالتی
پیدا کند که انگار کله اش سبک و خالی
شده است، حالت استفراغ داشته باشد،
تنگی نفس داشته باشد. یا به عبارت دیگر
نفسش بند بیاد.

آژین زمانی ظاهر می شود که شما
مشغول فعالیت بدنی، یا آنکه
تحت تأثیر هیجانات بدنی هستید.
که فرد مشغول استراحت است.

علام و آثار، پس از گذشت ۱۰ دقیقه اگر علام و آثار بیش از ۱۵ دقیقه بطول
از بین میرود.

علام و آثار با استراحت، یا با استفاده آثار و علام با استراحت، یا با استفاده از
از فرصهای نیترات یا افشارنک، از قرص نیترات، یا اسپری، بطور کامل از
بین میرود.

اگر همچویی کنکنی داشت اید شایست است با آهالانس خود این پارسان بر سانید.
بیا قلب آلتان

پکون پرنسپ آثربین صدری را یعنی ده؟

گواینکه تشخیص آثربین صدری در زنان مشکل تراست با این وجود اگر شما مبتلا به آثربین صدری شده باشید پزشک شما میتواند آن را تشخیص دهد. پزشک، به قلب شما گوش میدهد، تعداد ضربان و ریتم آن را بررسی میکند، وحالت عمومی شمارامی سنجد و یکی دیگر از کارهایی که میکند این است که میخواهد اطمینان یابد شما دیابت ندارید. آزمایش دیگری که حتماً انجام خواهد شد این است که کلسترول خون شمارانیز آزمایش خواهد کرد. با این آزمایش میخواهد سطح کلسترول خون شمارا را داشته باشد و مطمئن گردد چربی های دیگری در خون شما هست یا نه؟

علاوه بر اینها پزشک شما ممکن است شمارا برای یک، یا چند آزمایش دیگر اعزام نماید. این آزمایشها عبارتند از:-

- یک الکترو کاردیو گرام (ECG) یا تمرین ECG.

- یک اسکن تالیوم.

- آنژیو گرافی کورونر قلب (cardiac catheterisation).

معمول این آزمایشات همه در بیمارستان و طی روز انجام می شود (چنین معنی میدهد که لازم نیست شما شب در بیمارستان توقف داشته باشید)، به این آزمایش هادرزی را شاره می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به جزوه cardiac investigation که از انتشارات بنیاد قلب انگلستان است مراجعه نمائید.

الکترو کاردیو گرام (ECG) یا تمرین ECG

احتمالاً پزشک شما، شمارا برای یک آزمایش الکترو کاردیو گرام

نمایه قلب انسان

اعزام خواهد نمود. این آزمایش، ریتم قلب شما و فعالیت الکتریکی قلب شمارا ثابت می‌کند. این آزما بیش بدون درد است و بیش از پنج دقیقه طول نمی‌کشد. تکه‌های فلزی کوچکی را که در پلاسترهای چسبناک گذاشته شده و به ماشینی که تغییرات را یادداشت می‌کند متصل است بر روی بازو، رانها، و سینه‌های شما می‌گذارند. ماشین، که پس از راه انداختن موارد را ثبت نموده است گزارش کار را در اختیار مسئول آن قرار می‌دهد. اگر عروق کورونر شما باریک و تنگ شده باشد، الکترو کاردیو گرام گزارشی غیر طبیعی و نامطلوب است. دستگاه مزبور قادر است شواهدی از تشخیص آنژین شما را بدست دهد و مشخص کند که تاچه حد حاد و خطرناک است.

غالباً آنژین صدری با ذوزدگی و تقلّل ظاهر می‌شود. این گفته چنین معنی می‌دهد که اگر زمانی که شما در استراحت بودید و از شما الکترو کاردیو گرام گرفته شده است ممکن است گزارشی که ماشین می‌دهد طبیعی باشد. بهمین علت است که از شما خواسته می‌شود تقلّل کنید تا در این حالت از شما کاردیو گرام گرفته شود. معمولاً برای انجام اینکار از شما می‌خواهند که بر روی دو چرخه نی مخصوص قرار گرفته و باز نمایند، یا اینکه بر روی نواری متحرک باشند و با حرکت نوار، بر روی آن قدم زنید و خودتان را با سرعت آن وفق دهید.

اسکن تالیوم (Thallium scan)

به این آزمایش، (radionuclide scan) نیز می‌گویند. تنها سه، یا چهار نفر در هر صد نفر افرادی که مشکوک به آنژین صدری هستند برای آزمایش اسکن تالیوم، معرفی می‌شوند. برای افرادی که قادر به نیاز قلب امکان نداشتن

تمرينهای ورزشی نیستند اين آزمایش مفید است (و بنا بر اين نصيحتاً آزمایش ورزشی کارديو گرام نيز داشته باشند). برای زنان، اسکن تالپوم مفید تر از تمرين ورزشی کارديو گرام است تا آثرین آنان تشخيص داده شود.

مقدار بسیار کمی از مواد رادیواکتیو (ایزوتوپ) هنگامی که بیمار بروی دوچرخه ثابت، یا چرخ گردنه مشغول ورزش است در خون وی تزریق می شود. دوربین بزرگی که درست در مقابل سینه بیمار نشانه رفت و کار گذاشته شده است اشعه های گاما نی که بواسیله ایزوتوپ خارج می شود دریافت میکند. این آزمایش نشان میدهد که کدام قسمت از ماهیچه های قلب در مضيقه خون است و بدنبال آن، دستگاه این احتیاج را اندازه می گیرد.

آخر کرانی عرق کوروز قلب

یک لوله باریک و میان تهی که به آن «catheter» میگویند در شریان ساعد یا بازوی شما، و یاد رکشاله ران شما داخل میکنند. آهسته آهسته آنرا به پیش می بردند تا آنکه به سرخر گک، یا شریان قلب شما برسد. به این عمل در زبان پزشکی «cardiac catheteisation» میگویند.

پس از این کار، مایعی رنگین را در شریان قلب شما تزریق میکنند و بدنبال آن از جهات، یا گوشه های مختلف با اشعه ایکس از شما عکس می گیرند. این کار، درست شباهت به آن دارد که از تمام جاده

بیاد قلب انگشتان

های بدن شماعکس گرفته شود و ضمن آن مشخص کند کجا این جاده تنگ و باریک شده است و این باریکی تاچه حداست. این آزمایش درد ناک نیست و به شما بیهوشی موضعی داده خواهد شد.
پکنمه آثرین درمان می شود؟

بیشتر افرادی که آثرین صدری داشته اند، در ابتدای کار دارو به آنها داده شده است. ولی ممکن است لازم گردد بعضی افراد، از همان اول کار به «آئزیوپلاستری»، یا جراحی «بای پاس» نیاز داشته باشند.

درمان دارویی

درمان دارویی ممکن است به دو طریق کمک کند:-

- توزیع خون به قلب شمارا زیاد تر کند.

- کاری را که قلب شما باید انجام دهد کاهش دهد.

بخاطر داشته باشید که هیچگاه نباید بدون قرص بمانید.

داروهایی که برای آثرین بکار گرفته می شوند عبارتند از: نیترات ها، بتا بلکرها، calcium channel blockers, potassium channel blockers.

نیترات ها

کار نیترات ها این است که رگهای را باز میکنند. کار قلب را کم میکنند و به گشاد کردن عروق کوروئر کمک مینمایند.

به محض آنکه شما مورد حمله آثرین صدری قرار گرفتید یکی از کپسول های نیترات گلیسریل (GTN) درزیزیان خود قرار دهید. یا آنکه قبل از آنکه احساس کنید آثرین صدری شما در حال ظاهر شدن است یکی از آن کپسول ها، یا قرص رادرزیزیان خود قرار دهید.

بیان قلب ایلان

همواره قرصها یا کپسول های خودتان را در جعبه مخصوص قرار دهید تا بهنگام ضرورت بر احتی بتوانند آبرا به شما برسانند. هشت هفته که از تاریخ آن گذشت آنرا عوض کنید حتی اگریک دانه از آن را مصرف نکرده باشید.

احتمال دارد اگر شما یک حمله آثرین داشته باشید از نوع اسپری این دارو برای شما تجویز کنند. هیچ وقت محتويات داخل شیشه راتکان ندھید. کار شما این باشد که زیر زبان خودتان را فشانک بزنید و بدنبال آن دهان خود را بیندید.

از بعضی از نیترات ها برای جلوگیری از آثرین استفاده میکنند. بعضی اوقات این موضوع بروی نوع قرص، ذکر شده است - مثلا isosorbide mononitrate یا isosorbide dinitrate . بقیه، میتوانند از طریق پوست از یک مشمع مخصوص جذب شوند. کاری که شما باید بکنید این است که هر روز چند ساعتی این مشمع را از بدن خودتان باز کنید تا از مقاوم شدن آن در برابر نیترات جلوگیری شود. با این وصف اگر دچار حمله آثرین شدید هنوز هم میتوانید از اسپری خودتان برای پاکیزگاری نیترات در زیر زبان استفاده کنید.

تأثیرات غیرمنتظره سردرد، گُر گرفتن، گیج رفتن سر، وضعف، ممکن است با مصرف نیترات ظاهر شود. ولی با استفاده از فرصلهای glyceryl trinitrate این تأثیرات معمولی است. البته هر چه استفاده از دارو ادامه یابد تأثیرات کمتر می شود.

ساده قلب افغانستان

تابلاکوها

این داروهای بابه صورت قرص در بازارهای داروئی عرضه می‌شود لازم است بلعیده شوند. کار آنها این است که میزان تپش قلب را کم می‌کنند. و به این ترتیب کاری را که قلب باشد انجام دهد کم می‌کنند. با این کار قلب به اکسیژن، خون و تغذیه کمتری نیاز نداشت. اگر بتا بلاکرهای بطور مرتب مصرف شوند، این کار می‌تواند به تناوب کمتر حملات آثرین بیانجامد.

بتا بلاکرهای افرادی که بیماری آسم، یا برونشیت دارند مناسب نیست. اگر شما بیماری دیابت دارید، احتمال دارد پزشک شما بتا بلاکرهای شما تجویز نکند. ولی باید گفت که منع تجویز در این باره چندان سفت و سخت نیست.

تائیرات غیرمنتظره

اگر بتا بلاکرهای باحتیاط مصرف شوند اثرات جانبی آنها بسیار نادر است. در هر حال، تأثیرات جزئی دارو، همواره متصور است. این تأثیرات شامل خستگی، بیحالی، و سرد بودن دستها و پاهای است. سایر اثراتی که کمتر ممکن است اتفاق بیفتد دل بهم خوردگی، اسهال، خارش پوست، عن، و یا سایر اختلالات جنسی، کابوس، و سوزن سوزنی شدن انگشت هاست.

مصرف بتا بلاکرهای را باید بدون راهنمایی پزشک، بطور ناگهانی قطع کرد زیرا ممکن است حالت آثرین شما را بدتر کند.

calcium channel blockers

calcium channel blocker را برای آن تجویز می‌کنند تا تناوب حمله های آثرین را کاهش دهند. چنانچه شما آسم، یا برونشیت داشته باشید، پزشک شما ممکن است بجای بتا بلاکرهای، برای شما از داروهای فوق

بناد قلب الکسان

یعنی calcium channel blockers تجویز کند. بعضی از پزشکان آن را برای بیمارانی که دیابت دارند نیز تجویز می‌کنند.

تأثیرات غیرمنتظره

تأثیرات جدی غیرمعمول است. تأثیراتی جزئی از قبیل گر گرفتن، سردرد، گیج گیجی، ضعف، باد کردن قوزک پا، وسیاری از اختلالات معدی، برای این داروها متصور است. مثلاً وراپامیل، از داروهایی است که بیوست های دردسردار ایجاد می‌کند.

Potassium channel activators

این داروهای نوع جدیدی از دارواست که برای آرامش بخشیدن دردهای آنژین صدری بکار گرفته می‌شوند. تأثیر مشابهی با نیترات‌ها دارند. زیرا دیواره عروق کورونر قلب را تسکین میدهند و سبب می‌شوند که جریان خون در رگها بیهود یابد. به خلاف نیترات‌ها، بنظر نمی‌رسد که با مصرف دائم اثر بیهود بخشی خود را از دست بدene.

تأثیرات ناخواسته

تأثیرات ناخواسته و غیرمنتظره potassium channel activators، سردرد اولیه، گر کشیدن، سوء‌هاضمه و منگ شدن است.

توکیپ با آمیختن داروهای باهم

اغلب نیترات‌ها و بتا بلاکرهای از همان آغاز درمان با یکدیگر تجویز می‌کنند. اگر نتوانند آنژین را کنترل کنند، احتمال دارد از باز دارنده‌های پتاسیم دار استفاده کنند.

بیان قلب اسلامان

آژیوپلاستی عروق کورونر قلب و براسی «بای پاس»
 چنانچه عروق کورونر شما باریک شده اند و عوارض بیماری شما
 دیگر با دارو تسبیک نمی یابد، یا اینکه آژین شما کم کم شمارا به مرگ
 تهدید می کند، احتمال دارد به شما پیشنهاد شود:
 - به عمل آژیوپلاستی تن در دهدید، یا اینکه
 - آماده برای جراحی «بای پاس» شوید.

آژیوپلاستی سرخرگ


اگر آژیوگرافی که از سرخرگ کورونر شمامی شود نشان دهد که
 آن رگ باریک شده است، ممکن است به شما پیشنهاد شود یک آژیو
 پلاستی داشته باشد. اینکار را برای آن می کنند تا توزیع خون به ماهیچه
 های قلب شمارا بهبود بخشد.

یک catheter (لوله لاستیکی نازک و توخالی)، که بالن کوچکی
 که میتوان آن را باد کسر دبر سر آن قرار دارد در یکی از سرخرگ های
 کشاله ران پای شما داخل می کنند و آنرا آنقدر جلو می برنند تا به
 سرخرگی که باریک شده است برسد. در این هنگام بالن را باد
 می کنند تا به کمک آن بتوانند مواد زائد و چربی را که مسئول این باریک
 شدن بوده است له کنند و از بین بیرون شود تا به این طریق آن سرخرگ را
 گشادتر کنند و راه عبور خون به قلب را هموار نمایند. به تصویری که در
 صفحه بعد است نگاه کنید.

بیان قلب انسان

Angioplasty

آریپلاستی

گیدر وایر
کم راهنمایبادی نبافته شده است
uninflated balloon
کاتھیتربالون از باد کردن
inflated balloon
کاتھیترسرخی کشیده شده است
widened artery

معمولاً عمل آنژیوپلاستی از رگ کورونر قلب موفقیت‌آمیز است، ولی بعضی از اوقات منجر به انسداد سرخرگ می‌شود. برای رفع این مشکل باید فوراً به عمل جراحی دست زد.

چهار، تا شش ماه پس از آنژیوپلاستی، اتفاق می‌افتد که سرخرگ دوباره باریک شود. اگر لازم باشد عمل آنژیوپلاستی را دوباره تکرار می‌کنند. متخصصینی که آنژیوپلاستی را نجام میدهند، این روزهای امیتوانند از «استنت» (نگهدارنده‌های فلزی) استفاده می‌کنند و آنرا در درون شاهرگ قرار میدهند تا احتمال باریک شدن رگ کمتر شود.

آنژیوپلاستی رگ‌های کوروئر قلب به یک شب بسته شدن در بیمارستان نیاز ندارد.

مل جراحی با پاس سرخرگ کورئر قلب


این، نوعی از جراحی‌های عمد است و به بسته شدن یک هفته ثی شما در بیمارستان می‌انجامد. تجربه ثابت کرده است که این عمل جراحی، برای کاهش عوارض آژین و بهبود وضع بیمارانی که به شدت سرخرگ کوروئر قلب آسان باریک شده بوده، مؤثر و مفید بوده است. خطر کوچکی در این عمل جراحی وجود دارد که تقریباً مانند عمل جراحی عمد بروی شکم بیمار است.

هدف از این عمل آن است که با ایجاد یک گذرگاه فرعی از خیر آن قسمت از سرخرگی که باریک شده است در گذرنداز طریق آن را و فرعی به قلب خون برسانند. برای انجام این کار، بزرگی که بین آنورت (رگ اصلی خون) که از قلب خارج می‌شود و نقطه نی بروی سرخرگ که بالاتر از محل باریک شده، یامسدود شده است (به تصویر صفحه بعدنگاه کنید) رگ خونی تازه نی پوندمی زندتاژ قسمت مسدود شده، یا باریک شده صرف نظر نمایند و جریان خون در سرخرگ را دوباره برقرار نمایند.

نیا قلب ایلان

قسمت مسدود شده، یا باریک شده صرف نظر نمایند و جریان خون در سرخرگ را دوباره برقرار نمایند. سالهای متعددی بود که برای این کار، از سیاهرگ پای بیمار استفاده نمی‌نمودند ولی بعداً تصمیم گرفته شد از دو سرخرگی که در جدار سینه قرار دارد (internal mammary arteries) استفاده نمایند. بنظر میرسد که احتمال باریک شدن این سرخرگ‌ها در مقام مقایسه با پیوندی از سیاهرگ‌های پا، کمتر است. بیماران بسیاری هستند که مخلوطی از هر دو را دارند.

Coronary bypass surgery



قبل از آنکه تصمیم به عمل جراحی بای پاس گرفته شود لازم است که شما عمل آنژیوپلاستی (صفحه ۱۰ را ملاحظه کنید) داشته باشید تا اطمینان یابند کدامیک از عروق کورونر شما باریک شده است. برای رسیدن به قلب، لازم است جراح، استخوان سینه شما را شکاف دهد. و بهمین علت است که پس از عمل، اثر زخم آن شکاف بیاد قلب انسان

برروی سینه شما باقی می‌ماند. بلا فاصله پس از عمل جراحی، شمادر سینه خودتان احساس ناراحتی می‌کنید ولی این احساس پس از چند روز متدرجاً ازین می‌رود. اگر سیاه‌گی را زبدن شما برداشته باشد، باز شما همان ناراحتی را دارید. پای شما ورم می‌کند و برروی آن نیز اثر زخم باقی می‌ماند.

بیشتر بیماران، یک یاد روز پس از جراحی میتوانند خارج از تختخواب خود برروی صندلی بنشینند و پس از یک هفته به منزل روند. باز گشت به کار معمولاً دو یا سه ماه پس از اخراج از بیمارستان امکان پذیر است.

برای اطلاعات بیشتر درباره اینکه در بیمارستان، قبل، یا بعد از عمل جراحی بای پاس چه خواهد گذشت، به جزو «جراحی قلب» که از انتشارات بنیاد قلب انگلستان است مراجعه نمایید.

آرتوپلاستیک پا می‌گذرد و قلب علت آثین صدری^۱ است. اگر شما برای آرتوپلاستی، یا جراحی بای پاس، مناسب تشخیص داده شدید، به شما یک پیشنهاد میدهم. هر یک از این دوروش محسن و معایبی دارد و بهر حال، دست آخر، تصمیم نهائی با شماست. تفاوت اصلی بین این دوروش بطور خلاصه در جدولی که در صفحه ۲۱ است نوشته شده است. آرتوپلاستی، نیاز به یک عمل جراحی بزرگ را ازین می‌برد. در هر حال، افرادی که آرتوپلاستی خواهند داشت، در مقام مقایسه با بیمارانی که بای پاس داشته‌اند، انتظار ریسک بیشتری را دارند که آثین آنان دوباره باز گردد،
بناد قلب انسان

و بر این تقدیر، ممکن است که بعد از درمانی بیشتر، و یا جراحی قلب نیازمند باشند. بطور کلی باید گفت که، از نقطه نظر ریسک سکته قلبی یا مرگ، در اولین سال، یا پنج سال پس از درمان داده شده فرق عمدی ثی بین آنژیوپلاستی و جراحی باشد نیست.

بنیاد قلب اسلام

آنژیوپلاستی یا جراحی بای پاس برای آنژین صدری؟

آنژیوپلاستی	جراحی بای پاس	آنژیوپلاستی
از چه نوع داروی بیهوشی استفاده میشود؟	بیهوشی کامل	بیهوشی موضعی
چه مدت لازم است پس از عمل در بیمارستان بستری بود؟	یک شب ۷-۱۰ روز	۷-۵ روز
چه مدت بعد از عمل می شود به کار باز گشت نمود؟	۳-۲ ماه	۷-۵ روز
چند تقریباً افراد باید ظرف مدت پنج سال دوبلاه از روش های بیوندی آورده (آنژیوپلاستی یا عمل بای پاس) استفاده نمایند؟	حدود پنجاه درصد بین ۵ و ۱۰ درصد (۵۵ در هر ۱۰۰ نفر) بین ۵ و ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ نفر	حدود پنجاه درصد بین ۵ و ۱۰ درصد (۵ در هر ۱۰۰ نفر)
چند درصد از بیماران ظرف مدت ۳۰ روز پس از عمل درگذشته اند؟	۲ درصد (۲۰ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر)	۵ درصد (۵ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر)
بطور کلی، فرق عمدۀ نی بین آنژیوپلاستی و جراحی بای پاس از نقطه نظر ریسک سکته قلبی یا مرگ، در اولین سه سال، پنج سال پس از شروع درمان نیست.		

بیاد قلب انسان

چه پیکم تا اجل ای مهد، آرژین جلوگیری کنم؟

اگر شما قبل آرژین صدری داشته اید، چندین کار است که میتوانید بکنید تا از بدتر شدن آرژین شما جلوگیری کند، با آنکه سبب شود که آرژین شما به مرحله حاد خود نزدیک شود و موجب سکته قلبی یا عمل جراحی بر روی قلب شما گردد.

اگر سیگار بی تسمه آن را ترک کنید

کشیدن سیگار یکی از علل بیماری‌های عروق کورونر قلب، بویژه بیماران جوانتر است. کشیدن سیگار قطعاً خطربناک است ولی کشیدن پیپ، یا سیگار برگ، نیز، چندان بی خطر نیستند. رسیک مردن به علت سیگار، طی مدت دو سال پس از ترک کردن آن، به نصف می‌رسد.

فشار خون خود را کنترل کنید

پرفشاری، یا فشار بالای خون، یکی دیگر از علل بیماری‌های کرونر قلب است که موجب می‌شود قلب سخت تر کار کند. اگر شما فشار خون دارید لازم است آن را کنترل کنید. افرادی که آرژین دارند، هدف‌شان باید این باشد که فشار خونشان پائین تر از $140/85$ باشد. بعضی اوقات میتوان به این هدف رسید مشروط بر آنکه وزن خود را کم کنید، تمرین‌های ورزشی را افزایش دهید، میزان مصرف الکل را کاهش دهید و نمک کمتر بخورید.

نمای عقب اسلتان

بیشتر بیماران برای پائین آوردن فشار خون خود احتیاج به مصرف داروهای پائین آورنده فشار خون دارند. (برای اطلاعات بیشتر درباره فشار خون جزو «فشار خون» منتشره از طرف بنیاد قلب انگلستان را مطالعه نمایید).

روابط کلسترول خون و بیشتر

سطح کلسترول موجود در خون شمارا میتوان اندازه گرفت. هدف باید آن باشد که سطح کلسترول خون شما بالاتر از ۱/۵mmols (میلی متر در لیتر) نباشد. اگر کلسترول خون شما حتی کمی بالاتر از این مقدار که سطح مطلوب است باشد، میتوانید از پائین آوردن آن سود ببرید.

داشتن یک رژیم غذائی سالم به این کار کمک می کند. معنی این گفته آن است که مصرف چربی و روغن، بویژه روغن های اشباع شده را که بیشتر در گوشت و فرآورده های لبنیاتی است پائین آورید. مواظب «چرب را با غذاهایی که نشاسته دارند، مانند پاستا، نان، وسیب زمینی عوض کنید. (برای اطلاعات بیشتر در این باره به جزو «برای قلب خود و کم کردن کلسترول خون خود تان غذابخورید»، که از انتشارات بنیاد قلب انگلستان است مراجعه کنید).

در عمل، بسیاری از افرادی که آئینه آورند دارند و میخواهند سطح کلسترول خون خودشان را پائین آورند، باید از داروهای مخصوص استفاده کنند تا از این راه به سلامت خود کمک نمایند.

بنیاد قلب انگلستان

ماهی چرب و غنی ماهی

خوردن ماهی های چرب، دو یا سه بار در هفته، ممکن است به پائین آوردن سطح «تری گلیسیرید»، (مواد چربی که در خون یافت می شود) خون شما کمک نماید و از لخته شدن خون شما در عروق کوروئر قلب، جلوگیری نماید. روغن مخصوصی که این تأثیرات مفید را برای خون دارد بنام «امگا-۳»، شناخته شده است. این معجون بویژه در ماهی های چرب مانند شاه ماهی، ماهی دودی، ماهی خال مخالفی، ساردين، سامون، تون تازه، فزل آلا و ماهی کولی یافت می شود.

بیوه و سبزیجات پرتری گلیسیرید


افرادی که روزانه بیش از پنج سهم میوه و سبزیجات میخورند احتمال آنکه به بیماریهای قلبی دچار شوند کمتر است. برای چه این موضوع هنوز ناشناخته مانده است، هنوز معلوم نیست. میگویند به آن علت است که این مواد غذایی حاوی، انتی اکسیدانت ها، ویتامین ها، و اسید فولیک هستند. از طرف دیگر دلیل قانع کننده ثی وجود ندارد که اگر انسان از قرصهای ویتامین میل کند همان تأثیرات را بدست خواهد آورد.

بهاره وزن خودکار را کنترل کنید

اگر همیشه به رابطه بین قد خود و وزن بدن که پیشنهاد شده است توجه داشته باشیم میتوان فشار خون را در سطح پائین نگاه داشت و از اضافه کار کردن قلب جلوگیری کرد. بخطاطر داشته باشد که کم کردن وزن شامل خوردن به طریق بهداشتی و افزودن برفعالیت های بدنی، هردو میباشد.

بیمه قلب اسلام

برای آنکه بدانید که آیا لازم است ازوزن خود بگاهیده جدول زیر نگاه کنید. خطی مستقیم، از بالا، یا پائین از طول قد خود در نظر گیرید (بدون کفش). بعد خط دیگری از عرض جدول، برای وزن بدن خود (بدون لباس)، در محلی که این دو خط یکدیگر را تلاقی می‌کنند علامت بگذارید. این علامت مشخص می‌کند که شما چقدر باید وزن کم کنید. یا اینکه وزن بدن شما مناسب است.



Overweight Fat Very
کی پر شرمن میز ورزشی داشت باشد /
فعالیت های بدنی کمک میکند که شما بدنی سالم داشته باشید و از
طرفی وزن زائد بدن خودتان را پایین آورید. بیشتر افراد، هنگامی که
سالم اند احساس بهتری از سلامت و صحبت خود دارند.

مہا قلب انگلستان