

شکم حاد چیست



تنظیم کننده و مترجم
رضایوردست گردان

مطالب موجود در این دانشنامه

مقدمه

آنوريسم آنورت

آپانديسيت

كله سيستيت

كوليك نوزادان

ديوركوليت

بلوك قلبى

عفونت كليوى

پريتونيت

پارگى طحال

مقدمه

شکم حاد عمدتاً به صورت درد حاد شکم نیازمند به مداخله جراحی تعریف می شود. علاوه بر درد شکم، نشانه ها و علائم دیگری از قبیل تهوع، استفراغ، یا اسهال ممکن است وجود داشته باشند

بیماری هایی که می توانند باعث شکم حاد شوند:

آپاندیسیت

انسداد روده باریک

کله سیستیت

ایسکمی روده

بیماری های التهابی لگن

زخم معده

نارسایی حاد کلیه

نارسایی مزمن کلیه سنگ های کلیوی

عفونت ادراری عوامل خطر یا مستعد کننده مصرف زیاد الکل، کشیدن زیاد

سیگار، استرس، مصرف مواد سوزاننده، و یبوست

علامت شکم حاد: درد شاه علامت شکم حاد است. اما برای تشخیص مشکل بیمار باید توجه داشت که سه دسته بندی اصلی درد در شکم، احشایی، سوماتیک و ارجاعی هستند، که باید با آن ها آشنا بود. درد احشایی از دیواره احشاء توخالی از قبیل کیسه صفرا یا آپاندیس، از کپسول احشاء توپری از قبیل کلیه یا کبد یا صفاق احشایی منشأ میگیرد

این درد به صورت مبهم که نمی توان جای آن را مشخص کرد، یادرد کرامپی توصف می شود. در اغلب موارد این درد همراه با تهوع و استفراغ، تعریق و تاکی کاردی می شود. درد سوماتیک، برخلاف درد احشایی، نوعی درد تیز است که در امتداد مسیرهای عصبی مشخص به نخاع ایجاد می شود. به دلیل اینکه مسیر ها به وضوح مشخص هستند، درد می تواند به ناحیه یا منطقه خاصی محدود شود

آنوریسم آئورت

آنوریسم آئورت از اختلالات همراه درد شکمی حاد است.

آنوریسم آئورت یک برآمدگی غیر طبیعی است که در دیواره رگ خونی اصلی (آئورت) رخ می دهد و خون را از قلب شما به بدن شما منتقل می کند. آنوریسم آئورت می تواند در هر نقطه از آئورت شما رخ دهد و ممکن است به شکل لوله (بدنه) یا گرد (ساکولار) باشد

آنوریسم آئورت شامل موارد زیر است

آنوریسم آئورت شکمی. آنوریسم آئورت شکمی در امتداد بخشی از آئورت که از شکم عبور می کند رخ می دهد

آنوریسم آئورت قفسه سینه. آنوریسم آئورت قفسه سینه در امتداد بخشی از آئورت که از حفره قفسه سینه عبور می کند رخ می دهد

ابتلا به آنوریسم آئورت خطر ابتلا به برش آئورت را افزایش می دهد

برش آئورت هنگامی رخ می دهد که پارگی در لایه داخلی دیواره آئورت ایجاد شود.

این باعث می شود یک یا چند لایه دیواره دیواره آئورت از هم جدا شود که باعث

تضعیف دیواره آئورت می شود.

داشتن آنوریسم آنورت همچنین خطر ابتلا به ترکیدن آنوریسم (پارگی) را افزایش

می دهد

Medical symptom of
aortic aneurysm

علامت پزشکی آنوریسم آئورت

درد پشت Back pain

سرگیجه Dizziness

تنگی نفس Short breath

پوست کم رنگ Calm skin



fppt.com

References

Goldman L, et al., eds. Diseases of the aorta. In: Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2016. <https://www.clinicalkey.com>. Accessed Sept. 1, 2017.

What is an aneurysm? National Heart, Lung, and Blood Institute. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/arm#>. Accessed Sept. 1, 2017.

Riggin EA. Allscripts EPSi. Mayo Clinic, Rochester, Minn. April 11, 2017.

آپاندیسیت التهاب آپاندیس

آپاندیسیت از اختلالات زمینه ساز درد شکمی حاد است.

آپاندیسیت التهاب آپاندیس است ، کیسه انگشتی که از روده بزرگ شما در سمت راست شکم شما ایجاد می شود

آپاندیسیت باعث درد در پایین شکم شما می شود. با این حال ، در بیشتر افراد ، درد در اطراف ناف شروع می شود و سپس حرکت می کند. هرچه التهاب بدتر شود ، درد آپاندیسیت به طور معمول افزایش می یابد و در نهایت شدید می شود

اگرچه هر کسی می تواند به آپاندیسیت مبتلا شود ، اما اغلب در افراد بین 10 تا 30 سال رخ می دهد. درمان استاندارد برداشتن جراحی آپاندیس است

علائم و نشانه های آپاندیسیت ممکن است شامل موارد زیر باشد

درد ناگهانی که از سمت راست شکم پایین شروع می شود

درد ناگهانی که در اطراف ناف شما شروع می شود و اغلب به سمت شکم پایین سمت راست شما تغییر می کند

دردی که در صورت سرفه ، پیاده روی یا حرکات مزاحم دیگر بدتر می شود

تهوع و استفراغ

از دست دادن اشتها

تب کم درجه که ممکن است با پیشرفت بیماری بدتر شود

یبوست یا اسهال

علل

انسداد در لایه آپاندیس که منجر به عفونت می شود ، علت احتمالی آپاندیسیت است. باکتریها به سرعت تکثیر می شوند و باعث می شوند که آپاندیس ملتهب ، متورم و پر از چرک شود. اگر به موقع درمان نشود ، آپاندیس می تواند پارگی ایجاد کند

عوارض

آپاندیسیت می تواند عوارض جدی ایجاد کند ، مانند

یک ضمایم پارگی. پارگی عفونت را در سراسر شکم شما (پریتونیت) گسترش

می دهد. این بیماری احتمالاً برای زندگی خطرناک است ، برای برداشتن آپاندیس و

تمیز کردن حفره شکمی شما نیاز به عمل جراحی فوری دارد

یک جیب چرک که در شکم شکل می گیرد. اگر آپاندیس شما ترکید ، ممکن است یک

جیب عفونت (آبسه) ایجاد کنید. در بیشتر موارد ، جراح با قرار دادن لوله از طریق

دیواره شکم شما به آبسه ، آبسه را تخلیه می کند. این لوله حدود دو هفته در محل کار

باقی مانده است و برای پاک کردن عفونت به شما آنتی بیوتیک داده می شود

پس از روشن شدن عفونت ، برای برداشتن زائد جراحی خواهید کرد. در بعضی موارد

آبسه تخلیه می شود و آپاندیس بلافاصله برداشته می شود

Medical symptom of appendicitis

علامہ پزشکی آپاندیسیت

Diarrhea اسهال

Fever تب

Jaundice زردی

Nausea تهوع

vomiting استفراغ



fppt.com

References

Appendicitis. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/appendicitis>. Accessed May 8, 2019.

Appendectomy: Surgical removal of the appendix. American College of Surgeons. <https://www.facs.org/~media/files/education/patient%20ed/app.ashx>. Accessed May 8, 2019.

Martin RF. Acute appendicitis in adults: Clinical manifestations and differential diagnosis. <https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed May 8, 2019.

Smink D, et al. Management of acute appendicitis in adults. <https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed May 8, 2019

کوله سیستیت التهاب کیسه صفرا

کوله سیستیت از اختلالات زمینه ساز درد حاد در شکم است

کوله سیستیت التهاب کیسه صفرا است. کیسه صفرا شما یک ارگ کوچک و گلابی - شکل در سمت راست شکم شما ، زیر کبد شما است. کیسه صفرا مایع گوارشی را در روده کوچک شما (صفرا) رها می کند

در بیشتر موارد ، سنگهای صفراوی مسدود کننده لوله منتهی به کیسه صفرا شما باعث ایجاد کولسیستیت می شوند. این منجر به ایجاد صفرا می شود که می تواند باعث التهاب شود. سایر علل کوله سیستیت شامل مشکلات مجاری صفراوی ، تومورها ، بیماری جدی و عفونت های خاص است

علائم و نشانه های کوله سیستیت ممکن است شامل موارد زیر باشد

درد شدید در قسمت فوقانی راست یا شکم مرکزی شما

دردی که به شانه راست یا پشت شما گسترش می یابد

حساسیت به لمس شکم شما

حالت تهوع

استفراغ

تب

شکم حاد

1
4

اغلب اوقات ، کوله سیستیت نتیجه ذرات سختی است که در کیسه صفرا (سنگ کیسه صفرا) شما ایجاد می شود. سنگ کیسه صفرا می توانند لوله (مجرای کیستیک) را مسدود کنند که از طریق آن صفرا هنگام خروج کیسه صفرا جریان می یابد. صفرا رشد می کند و باعث التهاب می شود

تومور یک تومور ممکن است از تخلیه صفرا به طور صحیح از کیسه صفرا جلوگیری کند ، و باعث ایجاد صفرا می شود که می تواند منجر به کوله سیستیت شود انسداد مجرای صفراوی. لگد زدن یا زخم شدن مجاری صفراوی می تواند باعث انسداد شود که منجر به کوله سیستیت شود

عفونت ایدز و برخی عفونت های ویروسی می توانند باعث التهاب کیسه صفرا شوند

شما می توانید با انجام اقدامات زیر برای جلوگیری از سنگ های صفراوی ، خطر ابتلا به کوله سیستیت را کاهش دهید

به آرامی وزن خود را از دست دهید. کاهش سریع وزن می تواند خطر سنگ صفرا را افزایش دهد.

وزن سالم خود را حفظ کنید. اضافه وزن داشتن باعث ایجاد سنگ صفراوی می شود.

یک رژیم غذایی سالم را انتخاب کنید. رژیم های غذایی پر چربی و فیبر کم ممکن است خطر سنگ صفرا را افزایش دهد.

Medical symptom of cholecystitis

علامہ کلہ سیسٹیت

vomiting استفراغ

Fever تب

Nausea تهوع

Abdominal pain درد شکم

Sweating تعریق

jaundice زردی



fppt.com

References

Zakko SF, et al. Acute cholecystitis: Pathogenesis, clinical features and diagnosis. <http://www.uptodate.com/home>. Accessed May 10, 2017.

Vollmer CM, et al. Treatment of acute calculous cholecystitis. <http://www.uptodate.com/home>. Accessed May 10, 2017.

Acute cholecystitis. Merck Manual Professional Version. http://www.merckmanuals.com/professional/hepatic_and_biliary_disorders/gallbladder_and_bile_duct_disorders/acute_cholecystitis.html?qt=cholecystitis&alt=sh 2011. Accessed May 10, 2017.

Gallstones. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/gallstones/index.aspx>. Accessed May 10, 2017.

Soper NJ, et al. Laparoscopic cholecystectomy. <http://www.uptodate.com/home>. Accessed May 10, 2017.

Laparoscopic gallbladder removal (cholecystectomy) patient information from SAGES. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. <https://www.sages.org/publications/patient-information/patient->

**information-for-laparoscopic-gallbladder-removal-
cholecystectomy-from-sages/. Accessed May 12, 2017.**

کولیک نوزادان از اختلالات زمیه ساز بروز درد شکم حاد است.

کودک شما هر شب هر ساعت یک ساعت گریه می کند

در طول 3 ماه اول زندگی ، آنها بیش از هر زمان دیگری گریه می کنند. اما وقتی نوزادی که سالم است ، چندین هفته دچار گرسنگی ، گریه زیاد و مشکل در آسایش می شود ، این علامت وضعیتی به نام کولیک است

کولیک بیش از 3 ساعت در روز و بیش از 3 روز در هفته رخ میدهد

اما پزشکان ممکن است کودک را قبل از آن نقطه کولیک را تشخیص دهند.

کولیک معمولاً به مشکلات بهداشتی اشاره نمی کند و سرانجام از بین می رود

تخمین زده می شود که تا 40٪ از کل نوزادان مبتلا به کولیک هستند. این بیماری

معمولاً بین هفته 3 و 6 بعد از تولد شروع می شود و تا زمانی که کودک 3 تا 4

ماهگی تمام می شود پایان می یابد. اگر کودک پس از آن هنوز زیاد گریه کند ، ممکن

است یکی دیگر از مشکلات بهداشتی باشد

پزشکان مطمئن نیستند که چه عاملی باعث ایجاد قولنج می شود. عدم تحمل شیر گاو به عنوان یک مقصر احتمالی مطرح شده است ،

اما پزشکان اکنون بر این باورند که این اتفاق به ندرت می افتد.

نوزادان که شیر مادر میخورند هم دچار شکم حاد میشوند .

در این موارد ، تغییر رژیم غذایی توسط مادر ممکن است به سهولت قولنج کمک کند. برخی از زنان شیرده متوجه می شوند که کاهش کافئین در رژیم غذایی آنها کمک

می کند تا کولیک نوزادکمتر شود در حالی که برخی دیگر هنگام از بین بردن لبنیات

سویا ، تخم مرغ یا گندم ، پیشرفت هایی را مشاهده می کنند

اثبات شده است که هیچ درمان تکمیلی باعث از بین رفتن قولنج نمی شود. اما روش هایی وجود دارد که زندگی را هم برای شما و هم برای بچه کولیکی شما آسان تر

می کند

با کودک خود قدم بزنید یا در یک صندلی تکان دهنده بخوابانید ، موقعیتهای مختلفی را امتحان کنید

کودک خود را در دامن خود روی شکم خود قرار دهید و پشت کودک را مالش دهید

کودک خود را در صندلی نوسان دار یا لرزان قرار دهید. حرکت ممکن است اثر تسکین دهنده داشته باشد

کودک خود را در صندلی ماشین نوزاد در قسمت عقب خودرو قرار دهید و به پیاده روی بروید. لرزش و حرکت خودرو اغلب به بهبودی کمک میکند

موسیقی پخش کنید - برخی از نوزادان به صدا و همچنین حرکت پاسخ می دهند

مادران شیرده باید به تغذیه خود دقت کنند

Medical symptom of colic

علامت پزشکی کولیک

Crying in child's

گریه نوزاد

Abdominal pain

درد شکم

Difficult bowel movement

مشواری کارکرد روده

Vomiting

استفراغ



fppt.com

References

McInerny TK, et al., eds. Colic. In: American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care. 2nd ed. Elk Grove Village, Ill.: American Academy of Pediatrics; 2017.

<https://pediatriccare.solutions.aap.org>. Accessed October 10, 2017.

Shelov SP, et al. Crying and colic. In: Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5. 6th ed. New York, N.Y.: Bantam Books; 2014.

Turner TL, et al. Infantile colic: Management and outcome. <https://www.uptodate.com/content/search>. Accessed Dec. 1, 2017.

Turner TL, et al. Infantile colic: Clinical features and diagnosis. <https://www.uptodate.com/content/search>. Accessed Dec. 1, 2017.

Pace CA. Infantile colic: What to know for the primary care setting. Clinical Pediatrics. 2017;56:616.

دیورتیکولیت التهاب دستگاه گوارش

دیورتیکولیت از علل زمینه ساز درد شکم حاد است.

دیورتیکول ، کیسه های کوچک و شکوفه ای هستند که می توانند در آستر دستگاه گوارش شما شکل بگیرند. آنها اغلب در قسمت تحتانی روده بزرگ دیده می شوند. دیورتیکول خصوصاً بعد از 40 سالگی شایع است و بندرت مشکلاتی ایجاد می کند با این حال ، گاهی اوقات ، یک یا چند کیسه ملتهب یا آلوده می شوند. این بیماری به عنوان دیورتیکولیت شناخته شده است

دیورتیکولیت می تواند باعث درد شدید شکم

تب ، حالت تهوع و تغییر چشمگیر در عادات روده شما شود

دیورتیکولیت خفیف را می توان با استراحت ، تغییر در رژیم غذایی و آنتی بیوتیک ها درمان کرد. دیورتیکولیت شدید یا عودکننده ممکن است به عمل جراحی نیاز داشته باشد

علائم و نشانه های دیورتیکولیت شامل موارد زیر است

درد ، که ممکن است برای چند روز ثابت و پایدار باشد. سمت چپ پایین شکم محل معمول درد است. با این حال ، گاهی اوقات ، سمت راست شکم دردناک تر است ، به خصوص در افراد نژاد آسیایی

تهوع و استفراغ

تب

حساسیت به شکم

یبوست یا ، معمولاً اسهال

معمولاً هنگامی ایجاد می شود که مکان های ضعیف در روده بزرگ تحت فشار قرار گیرند. این باعث می شود که کیسه های به اندازه سنگ مرمر از دیواره روده بزرگ بیرون زده شود

دیورتیکولیت در هنگام پارگی دیورتیکول رخ می دهد ، که منجر به التهاب یا عفونت یا هر دو می شود

عوامل خطر

چندین عامل ممکن است خطر ابتلا به دیورتیکولیت را افزایش دهد

سالخوردگی. شیوع دیورتیکولیت با افزایش سن افزایش می یابد

چاقی با اضافه وزن جدی احتمال ابتلا به دیورتیکولیت را افزایش می دهد

سیگار کشیدن. افرادی که سیگار می کشند بیشتر از افراد غیر سیگاری مبتلا به دیورتیکولیت هستند

عدم ورزش. به نظر می رسد ورزش شدید خطر ابتلا به دیورتیکولیت را

کاهش می دهد

رژیم غذایی پر چربی حیوانی و فیبر کم است. به نظر می رسد رژیم غذایی با فیبر کم همراه با مصرف زیاد چربی حیوانات باعث افزایش خطر می شود ، اگرچه نقش فیبر کم به تنهایی مشخص نیست

Medical symptom of diverticulitis

علامہ پزشکی دیورتیکولیت

Constipation پیوست

Diarrhea اسهال

Weightless کاهش وزن

Change bowel movement

تغییر عملکرد روده



fppt.com

References

Pemberton JH, et al. Colonic diverticulosis and diverticular disease: Epidemiology, risk factors, and pathogenesis. <https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed July 24, 2018.

Tursi A, et al. Review article: The pathophysiology and medical management of diverticulosis and diverticular disease of the colon. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2015;42:664.

Pemberton JH, et al. Clinical manifestations and diagnosis of acute diverticulitis in adults. <https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed July 24, 2018.

Thompson AE. Diverticulosis and diverticulitis. JAMA. 2016;316:1124.

Dobbins C, et al. The relationship of obesity to the complications of diverticular disease. Colorectal Disease. 2006;8:37.

AskMayoExpert. Diverticular treatment. Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2018.

بلوک قلبی

بلوک قلبی از اختلالاتی است که زمینه ساز شکم حاد است.

حمله قلبی هنگامی رخ می دهد که جریان خون به قلب مسدود شود. این انسداد اغلب به صورت چربی ، کلسترول و سایر مواد تشکیل می شود ، که در شریان هایی که قلب را تغذیه می کنند ، پلاک ایجاد می کنند

پلاک سرانجام از هم می شکند و لخته تشکیل می دهد. جریان خون قطع شده می تواند بخشی از عضله قلب را آسیب رسانده یا از بین ببرد

حمله قلبی که به آن انفارکتوس میوکارد نیز گفته می شود ، می تواند کشنده باشد ، اما درمان با گذشت سال ها به طرز چشمگیری بهبود یافته است

علائم و نشانه های حمله قلبی رایج عبارتند از

فشار ، سفتی ، درد یا احساس فشار یا سوزش در قفسه سینه یا بازو هایی که ممکن است به گردن ، فک یا پشت شما گسترش یابد

حالت تهوع ، سوء هاضمه ، سوزش قلب یا درد شکم

تنگی نفس

عرق سرد

خستگی

همه افرادی که حملات قلبی دارند علائم یکسانی ندارند یا علائم آن یکسان است. برخی از افراد درد خفیف دارند. دیگران درد شدیدتری دارند. برخی از افراد هیچ علامتی ندارند. برای دیگران ، اولین علامت ممکن است ایست قلبی ناگهانی باشد. با این وجود ، هر چه علائم و نشانه های بیشتری داشته باشید ، احتمال حمله قلبی بیشتر خواهد شد

برخی از حملات قلبی به طور ناگهانی بروز می کنند ، اما بسیاری از افراد ساعت ها ، روزها یا هفته ها قبل از علائم و علائم هشدار دهنده دارند.

اولین هشدار ممکن است درد مکرر یا فشار قفسه سینه (آنژین) باشد که با فشار وارد می شود و با استراحت تسکین می یابد. آنژین در اثر کاهش موقتی جریان خون به قلب ایجاد می شود

حمله قلبی هنگامی رخ می دهد که یک یا چند شریان کرونر شما مسدود شود. با گذشت زمان ، یک شریان کرونر می تواند از ساختن مواد مختلف از جمله کلسترول (آترواسکلروز) باریک شود. این وضعیت که به بیماری عروق کرونر معروف است ، بیشتر حملات قلبی را ایجاد می کند

در هنگام سکتة قلبی ، یکی از این پلاکها می تواند باعث پارگی و ریختن کلسترول و سایر مواد در جریان خون شود.

در محل پارگی لخته خون تشکیل می شود. اگر به اندازه کافی بزرگ باشد ، لخته می تواند جریان خون را از طریق شریان کرونر مسدود کند

عوامل خطر حمله قلبی شامل موارد زیر است

سن. مردان در سن 45 سال و بالاتر و خانمها از 55 سال و بالاتر

تنباکو این شامل سیگار کشیدن و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دود دست دوم است

فشار خون بالا. با گذشت زمان ، فشار خون بالا می تواند به شریان هایی که قلب شما را تغذیه می کنند آسیب برساند

میزان کلسترول خون یا تری گلیسیرید خون بالا

چاقی چاقی با سطح کلسترول خون بالا

دیابت

Medical symptom of
Heart attack

علام پزشکی گرفتگی قلب

Chest pain درد قفسه سینه

Short breath تنگی نفس

Anxiety اضطراب

Weak ضعف

Cardiogenic shock

شو کاردیوژنیک



fppl.com

References

Heart attack. National Heart, Lung, and Blood Institute.
<https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/heart-attack>.
Accessed March 9, 2018.

Reeder GS, et al. Criteria for the diagnosis of acute myocardial infarction.
<https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed March 9, 2018.

About heart attacks. American Heart Association.
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/Heart-Attack_UCM_001092_SubHomePage.jsp. March 9, 2018.

Acute coronary syndrome. American College of Cardiology. **<https://www.cardiosmart.org/Heart-Conditions/Acute-Coronary-Syndrome>. Accessed March 13, 2018.**

2014 Hands-Only CPR fact sheet. American Heart Association.
<http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/HandsOnly>

CPR/Hands-Only-CPR_UCM_440559_SubHomePage.jsp.
Accessed March 13, 2018.

عفونت کلیوی

عفونت کلیه از اختلالات زمینه ساز درد حاد شکم است.

(UTI) عفونت کلیه (پیلونفریت) نوعی عفونت مجاری ادراری

است که به طور کلی در مجرای ادراری یا مثانه شما شروع می شود و به یکی یا هر دو کلیه سرایت میکند

عفونت کلیه نیاز به توجه فوری پزشکی دارد. اگر به درستی درمان نشود ، یک عفونت کلیه می تواند به کلیه های شما آسیب برساند یا باکتری ها می توانند به جریان خون شما سرایت کرده و یک عفونت تهدید کننده برای زندگی ایجاد کنند

علائم و نشانه های عفونت کلیه ممکن است شامل موارد زیر باشد

تب

لرز

درد پشت ، پهلو (پهلو) یا کشاله ران

درد شکم

تکرر ادرار

فشار شدید و مداوم برای ادرار کردن

احساس سوزش یا درد هنگام ادرار کردن

شکم حاد

3
7

علل

باکتری هایی که از طریق لوله ای که ادرار از بدن شما (مجرای ادرار) وارد ادرار شما می کند ، می توانند تکثیر و به کلیه های شما سفر کنند. این شایع ترین علت عفونت کلیه است

باکتریهای ناشی از عفونت در جای دیگر بدن شما نیز می توانند از طریق جریان خون به کلیه های شما سرایت کنند. اگرچه ابتلا به عفونت کلیه غیر معمول است ، اما ممکن است رخ دهد - به عنوان مثال ، اگر شما یک مفصل مصنوعی یا یک دریچه قلب دارید که آلوده می شود

با انجام اقدامات پیشگیری از عفونت ادراری ، خطر ابتلا به عفونت کلیه را کاهش دهید.

مایعات مخصوصاً آب بنوشید. مایعات می توانند هنگام دفع ادرار از باکتری ها از بدن شما کمک کنند

به محض نیاز ادرار کنید. در صورت احساس نیاز به ادرار ، از تأخیر دفع ادرار خودداری کنید

مثانه را بعد از مقاربت خالی کنید. ادرار کردن هر چه سریعتر بعد از مقاربت به پاک کردن باکتری ها از مجرای ادراری کمک می کند و خطر ابتلا به عفونت را کاهش می دهد

با دقت پاک کنید. پاک کردن جلو و عقب بعد از ادرار کردن و بعد از حرکت روده به جلوگیری از انتشار باکتریها به مجرای ادراری کمک می کند
از استفاده از محصولات زنانه در ناحیه دستگاه تناسلی خودداری کنید

Medical causes of kidney infection

علل پزشکی عفونت کلیه

Cystitis سیستیت

Kidney damage آسیب کلیه

Urinary bleeding خونریزی ادراری

Dysuria دیسوری سوزش ادرار



fppt.com

References

Pyelonephritis: Kidney infection. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse.

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-infection-pyelonephritis>. Accessed May 4, 2017.

Kidney infection. American Kidney Fund.

<http://www.kidneyfund.org/kidney-disease/kidney-problems/kidney-infection.html>. Accessed May 4, 2017.

Hooton TM, et al. Acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women.

<https://www.uptodate.com/home>. Accessed May 4, 2017.

Frequently asked questions. Gynecologic problems FAQ050. Urinary tract infections. American College of Obstetricians and Gynecologists.

<http://www.acog.org/~media/ForPatients/faq050.pdf?dmc=1&ts=20140523T1534363926>. Accessed May 4, 2017.

**Hooten TM. Patient education: Kidney infection
(pyelonephritis) (Beyond the Basics).
<https://www.uptodate.com/home>. Accessed May 4, 2017.**

پریتونیت از اختلالات زمینه ساز درحادث شکم است.

پریتونیت التهاب صفاقی است - غشایی مانند ابریشم

دیواره داخلی شکم شما صاف می شود و اندام های داخل شکم شما را می پوشاند - این معمولاً به دلیل عفونت باکتریایی یا قارچی است.

پریتونیت می تواند ناشی از هرگونه پارگی (سوراخ شدن) در شکم شما یا به عنوان عارضه ای از سایر شرایط پزشکی باشد

پریتونیت برای مبارزه با عفونت و در صورت لزوم برای درمان هرگونه بیماری زمینه ای ، نیاز به مراقبت سریع پزشکی دارد.

درمان پریتونیت معمولاً شامل آنتی بیوتیک ها و در بعضی موارد جراحی است. در صورت عدم درمان ، پریتونیت می تواند منجر به عفونت شدید و بالقوه تهدید کننده زندگی در سراسر بدن شما شود

اگر تحت درمان دیالیز صفاقی قرار دارید ، می توانید با رعایت بهداشت خوب قبل ، حین و بعد از دیالیز ، از صدمه جلوگیری کنید

علائم و نشانه های پریتونیت شامل موارد زیر است

درد شکم یا حساسیت به پوست

نفخ یا احساس پر بودن (دوری) در شکم

تب

تهوع و استفراغ

از دست دادن اشتها

اسهال

بازده ادرار کم است

تشنجی

عدم توانایی در عبور از مدفوع یا گاز

خستگی

عواملی که خطر پریتونیت شما را افزایش می دهد عبارتند از

دیالیز صفاقی. پریتونیت در بین افراد تحت درمان با دیالیز صفاقی شایع است

سایر شرایط پزشکی. شرایط پزشکی زیر خطر ابتلا به پریتونیت را افزایش می دهد:
سیروز ، آپاندیسیت ، بیماری کرون ، زخم معده ، دیورتیکولیت و پانکراس
تاریخچه پریتونیت. به محض ابتلا به پریتونیت ، احتمال ابتلا به آن مجدداً بیشتر از آن
است که برای کسی که هرگز پریتونیت نداشته باشد

Medical symptom of peritonitis

علامہ پزشکی پریٹونیت

Abdominal pain درد شکم

Nausea تهوع

Fever تب

Stomach ulcer زخم معده

Septic shock شوک سپتیک



fppt.com

References

Long SS, et al. Peritonitis. In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. 4th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2012. <http://www.clinicalkey.com>. Accessed March 12, 2015.

Ferri FF. Peritonitis, secondary. In: Ferri's Clinical Advisor 2015: 5 Books in 1. Philadelphia, Pa.: Mosby Elsevier; 2015. <https://www.clinicalkey.com>. Accessed March 12, 2015.

Treatment methods for kidney failure: Peritoneal dialysis. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse (NKUDIC). <http://kidney.niddk.nih.gov/KUDiseases/pubs/peritoneal/index.aspx>. Accessed March 13, 2015.

پارگی طحال

پارگی طحال از اختلالات زمینه ساز بروز شکم حاد است.

پارگی طحال یک اورژانس پزشکی است که در نتیجه شکستن سطح طحال شما اتفاق می افتد. طحال شما که دقیقاً در زیر قفسه دنده در سمت چپ شما قرار دارد ، به بدن شما کمک می کند تا با عفونت مبارزه کند و سلولهای قدیمی خون را از جریان خون فیلتر کند.

به عنوان مثال ، ضربات شدید به شکم شما - در حین تصادف ورزشی ، تصادف درگیری یا تصادف با اتومبیل - علت معمول طحال پارگی است. اگر طحال بزرگ شده دارید ، تروما خفیف ممکن است باعث پارگی شود. بدون درمان اورژانس ، خونریزی داخلی ناشی از پارگی طحال می تواند تهدید کننده زندگی باشد

برخی از افراد با طحال پاره شده نیاز به عمل اورژانس دارند. سایرین با چند روز مراقبت در بیمارستان قابل معالجه هستند

علائم

علائم و نشانه های طحال پارگی شامل موارد زیر است

درد در قسمت بالای شکم

حساسیت به لمس شکم بالا

درد شانه چپ

سردرگمی ، سرگیجه یا سرگیجه

عوارض

پارگی طحال می تواند خونریزی خطرناک را در حفره شکم شما ایجاد کند

جلوگیری

اگر به طحال بزرگ شده مبتلا شده اید ، از پزشک خود بپرسید که آیا برای چندین هفته باید از فعالیت هایی که می تواند باعث پارگی آن شود جلوگیری کنید. اینها ممکن است شامل ورزش های تماسی ، بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت های دیگری باشد که خطر ایجاد ضربه به شکم را افزایش می دهد

Medical symptom of Spleen rupture

علامہ پزشکی پارگی طحال

Pain درد

Tenderness حساسیت

Dizziness سرگیجه

Anemia کم خونی

Easy bleeding خونریزی آسان



fppt.com

References

AskMayoExpert. Splenic injury. Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2018.

Maung AA, et al. Management of splenic injury in the adult trauma patient.

<https://www.uptodate.com/contents/search>. Accessed April 12, 2019.

Dragomir M, et al. Patients after splenectomy: Old risks and new perspectives. Chirurgia. 2016;111:393.

Hoffman R, et al. Infectious mononucleosis and other Epstein-Barr virus-associated diseases. In: Hematology: Basic Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2018. <https://www.clinicalkey.com>. Accessed April 12, 2019.

Liu J, et al. Diagnosis and treatment of atraumatic splenic rupture: Experience of 8 cases. Gastroenterology Research and Practice. 2019;2019:1.

<https://doi.org/10.1155/2019/5827694>. Accessed April 12, 2019.