



دانشنامه آنتی بیوتیک های مناسب در اسهال
تنظیم کننده
رضا پوردست گردان میکروبیولوژیست

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

مطالب موجود در این دانشنامه

مقدمه

آزیترومایسین

سفوتاکسیم

سفالکسین

سیپروفلوکساسین

داکسی سایکلین

اریترومایسین

مترونیدازول

وانکومایسین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

بزرگترین و اصلی ترین علت اسهال عوامل عفونی است که این عوامل از طریق مختلف وارد بدن می شود. گاهی با خوردن میوه و سبزی که به درستی و کامل شستشو داده نشده باشد اسهال ایجاد می شود. در بعضی مواقع به دلیل رعایت نکردن بهداشت به خصوص بعد از اجابت مزاج عفونت موجود در دست هایی که شسته نشده اند و.. وارد بدن شده و اسهال رخ می دهد

دلایل اصلی اسهال

تا به حال به این فکر کرده اید چرا اسهال می گیرید؟ این امر می تواند چندین دلیل داشته باشد. برخی از آن ها در زیر می بینید

- حساسیت غذایی: گاهی اوقات آدم ها محصولات را مصرف می کنند که بدن شان نمی پذیرد. بدن تمایل دارد تا حد امکان این محصولات خوراکی را آزاد کند و همین امر باعث ایجاد اسهال می شود
- آب آلوده: تابه حال پیش آمده است جای جدیدی بروید و با خوردن آب دچار اسهال شده باشید؟ گاهی اوقات لازم نیست آب آلوده باشد که اسهال بگیرد. کافی است که خارجی باشد تا باعث شل شدن مدفوع شود
- بیماری های روده: انواع مختلفی بیماری های روده ای وجود دارد که آدم ها از آن ها رنج می برند. یکی از شناخته شده ترین نوع آن ها آی بی اس یا سندروم روده ی تحریک پذیر است.

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

ابتلا به یک بیماری روده می تواند منجر به اسهال گاه و بیگاه شود

اگر کنجاوید بدانید اسهال چه مدت طول می کشد. معمولاً به فردی که به آن مبتلا شده است بستگی دارد. اگر افراد به سرعت دست به دامن درمان های خانگی شوند، ممکن است آن قدرها طول نکشد.

پس لازم است با درمان خانگی اسهال که موثر و سریع باشند آشنا شوید. ای درمان ها با مواد مغذی و در دسترس در خانه و بدون مصرف داروهای شیمیایی با همان اثربخشی عمل می کنند با این تفاوت که عوارض جانبی ندارند

در صورتی که فرد دچار اسهال مشکلاتی دارد که استفاده از مایعات را برایش محدود شده، پیش از شروع مصرف زیاد مایعات حتما باید با پزشک مشورت کند

کودکان، زنان باردار و سالمندان مبتلا به اسهال باید بسیار مراقب باشد

شیرخوارانی که شیر خشک می خورند باید با مشورت پزشک از شیر خشک مناسب تری استفاده کنند، اما در مورد شیرخوارانی که شیر مادر می خورد، هیچ تفاوتی ندارد و نباید شیر مادر قطع شود

کم شدن آب بدن ناشی از اسهال می تواند برای کودکان خطرناک باشد. قبل از دادن هر دارو باید با یک پزشک مشورت شود

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

نکات بیشتر از ابتلا به اسهال تا درمان آن

اگر در زمان ابتلا به اسهال این علائم را مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید

اگر ابتلا به اسهال شما بعد از گذشت 2 روز هیچ تغییری البته رو به بهبودی نداشت

اگر مدفوع شما خونی شد

اگر فرد مبتلا به اسهال با لاتر از 45 سال بود چرا که بعد از 40 سالگی مقاومت سیستم ایمنی بدن تا حدی پایین می آید

اگر در کنار اسهال بسیار تشنه می شوید و دهانتان خشک می شود

اگر در کنار اسهال تب هم دارید

نوشیدنی های الکلی، کافئین دار و شیرین حالت اسهال را شدیدتر می کند. نوشیدنی های ورزشی آماده می تواند به جذب بهتر مایعات و درمان اسهال کمک کند

چای: چای سیاه حاوی 8-12 درصد تانن است، بنابراین یکی از بهترین داروهای ضداسهال طبیعی است که هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای مصرف ندارد

اگر اسهال ایجاد شده به دلیل تغییر شرایط غذایی و آب و هوایی باشد (مثلا در مسافرت) و نه در اثر میکروب ها و ویروس ها، استفاده از چای به صورت پودر باعث ایجاد تعادل هضم و جذب و برگشت شرایط طبیعی بدن از حالت اسهال به حالت طبیعی است

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

زمانی که فردی مبتلا به اسهال از شما در مورد درمان می پرسد بدون معطلی کته ماست را به او پیشنهاد

می کنید که این روش درمانی فوق العاده موثر است

متخصصین طب سنتی دم کرده یونجه را پیشنهاد می کنند البته به اندازه نه زیاد تر از حد. درمان سنتی دیگر دم

کردن چای ریحان است

میوه هایی که اسهال را بند می آورند: موز، سیب، خرما و ازگیل

آزیترومایسین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک است

این به طور گسترده ای برای درمان عفونت های قفسه سینه مانند پنومونی ، عفونت بینی و گلو مانند عفونت سینوسی (سینوزیت) ، عفونت های پوستی، بیماری لایم و برخی از عفونت های منتقله از راه جنسی و اسهال استفاده می شود

این دارو به عنوان کپسول، قرص و مایع که شما می نوشید در دسترس است. این نیز می تواند با تزریق داده شود، اما این معمولاً تنها در بیمارستان انجام می شود

آزیترومایسین معمولاً یکبار در روز مصرف می شود. سعی کنید آن را هر روز در همان زمان مصرف کنید

اگر پزشک شما کپسول های آزیترومایسین را تجویز کرده باشد، باید حداقل یک ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

اگر قرص یا شربت دارید، می توانید آنها را با یا بدون غذا مصرف کنید

برای اکثر عفونت ها، باید در عرض چند روز احساس راحتی کنید، اما هنوز هم باید دوره کامل پزشکی خود را کامل کنید

شایعترین عوارض جانبی آزیترومایسین، احساس یا بیماری، اسهال، سردرد یا تغییرات در سلیقه شماست

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

این برای برخی افراد مناسب نیست. برای اطمینان از اینکه آزیترومایسین برای شما امن است، به پزشک خود بگویید اگر شما

واکنش آلرژیک نسبت به آزیترومایسین یا هر دارو دیگر در گذشته داشته است
مشکلات کبدی یا کلیوی

مشکلات قلبی، از جمله ضربان قلب نامنظم (آریتمی)

قبل از مصرف آنتی بیوتیک اسهال دارید

میاستنی گراویس - آزیترومایسین می تواند علائم این بیماری تضعیف عضله را بدتر کند
آزیترومایسین باعث افزایش قند خون میشود

عوارض جانبی رایج آزیترومایسین

احساس تهوع (تهوع)

اسهال یا بیماری (استفراغ)

از دست دادن اشتها

سر درد

احساس سرگیجه یا خستگی

تغییر به احساس طعم شما

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

آزیترومایسین معمولاً در دوران بارداری یا شیردهی توصیه نمی شود. اما پزشک ممکن است آن را تجویز کند، اگر مزایای مصرف آزیترومایسین بیشتر از خطرات باشد



✓ Reference

- ✓ •Azithromycin - azithromycin tablet, film coated; Azithromycin - azithromycin powder, for suspension. (2017).
- ✓ dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=f5b6daad-b5a9-462d-8e10-db22a7af1c72
- ✓ •Zithromax (azithromycin) 250 mg and 500 mg tablets and oral suspension. (2017).
- ✓ accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/050670s032,050710s046,050711s043,050784s030lbl.pdf
- ✓ •Zithromax (azithromycin) 600 mg tablets and oral suspension. (2017).
- ✓ accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/050693s029,050730s037lbl.pdf

سفوتاکسیم



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

سفوتاکسیم یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین

است. جهت مبارزه با باکتری در بدن شما کار می کند

معلوم نیست که آیا این دارو به نوزاد متولد نشده آسیب می رساند. اگر حامله باشید، به پزشک خود بگویید

سفوتاکسیم به شیر مادر منتقل می شود و یا می تواند به یک کودک آسیب برساند

سفوتاکسیم عفونت ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا را درمان نخواهد کرد

عوارض جانبی رایج ممکن است شامل موارد زیر باشد

سوء هاضمه ، درد معده؛

تهوع ، استفراغ

خارش واژن



✓ Reference

✓ •Avelox - moxifloxacin hydrochloride tablets, for oral use.
Avelox - moxifloxacin hydrochloride injection, for
intravenous use. (2018).

✓ [accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/021085s064,
021277s060lbl.pdf](https://accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/021085s064,021277s060lbl.pdf)

✓ •Moxifloxacin - moxifloxacin hydrochloride tablet, film
coated. (2017).

✓ [dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=71b02da
1-3175-1db8-192a-c0a8a6cd98a5](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=71b02da1-3175-1db8-192a-c0a8a6cd98a5)

سفالکسین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

سفالکسین یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین است

برای مبارزه با باکتری در بدن شما کار می کند

Cephalexin

برای درمان عفونت های ناشی از باکتریها، از جمله عفونت های تنفسی فوقانی، عفونت گوش

عفونت های پوستی، عفونت های دستگاه ادراری و عفونت های استخوانی و اسهال استفاده

می شود

داروهای آنتی بیوتیک می تواند باعث اسهال شود، که ممکن است نشانه عفونت جدید باشد.

اگر اسهال دارید آ خونریزی دارید، با پزشک خود تماس بگیرید. از داروهای ضد اسهال استفاده

نکنید، مگر اینکه پزشک شما به شما بگوید

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

اگر علائم واکنش آلرژیک به سفالکسین دارید، به اورژانس مراجعه کنید

علائم آلرژی سفالوسپورین

درد شدید معده

زردی (زرد شدن پوست یا چشم)؛

کبودی آسان، خونریزی غیرمعمول (بینی، دهان، واژن، یا رکتوم)، نقاط مشخص بنفش یا قرمز

زیر پوست شما؛

کمی ادرار کردن

آشفتگی، سردرگمی، توهمها؛

واکنش شدید پوست - تب، گلودرد، تورم در چهره یا زبان

تنفس سخت؛ تورم چهره، لب ها، زبان یا گلو



Reference

Cephalexin - cephalexin capsule; cephalexin - cephalexin powder, for suspension; cephalexin - cephalexin tablet. (2016).

dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=19307ff0-71de-477b-965d-ea243e5ede3a

Medically reviewed by Creighton University, Center for Drug

Information and Evidence-Based Practice on April 12, 2018 — Written

by University of Illinois-Chicago, Drug Information Group

سیپروفلوکساسین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

(سیپروفلوکساسین) یک آنتی بیوتیک است که با باکتری در بدن مبارزه میکند

برای درمان انواع مختلف عفونت های باکتری استفاده می شود

همچنین برای درمان افرادی که در معرض نوع خاصی از طاعون قرار دارند استفاده می شود

در صورت داشتن نشانه هایی از قبیل: سردرد، گرسنگی، تحریک پذیری، بی حسی، سوزش

سوزن، درد سوزش، سردرگمی، تحریک، پارانوئیا، مشکلات حافظه یا تمرکز، افکار خودکشی، یا

درد ناگهانی یا حرکت ناگهانی، مصرف دارو را قطع کنید

در موارد نادر، سایپروفلوکساسین ممکن است باعث آسیب به آنورت شما شود که می تواند منجر

به خونریزی خطرناک یا مرگ شود.

در صورت درد شدید و پایدار در قفسه سینه، معده یا پشت، به کمک پزشکی اضطراری

مراجعه کنید

سیپروفلوکساسین را با محصولات لبنی مانند شیر یا ماست یا آب با غنی سازی کلسیم مصرف

نکنید.

شما می توانید این غذاها را با وعده های غذایی خود بخورید یا نوشید، اما هنگام مصرف این

دارو از آنها استفاده نکنید. آنها می توانند دارو را کمتر موثر کنند

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

مواردی که مصرف دارو باید متوقف شود

قند خون پایین -

سردرد، گرسنگی،

عرق کردن، تحریک پذیری،

سرگیجه ، حالت تهوع ،

علائم عصبی در دست ها، بازوها، پاها یا پاها - بی حسی، ضعف، سوزن شدن، درد سوزش؛

تغییرات رفتاری یا رفتاری جدی - نگرانی، سردرگمی، تحریک، پارانوئیا،

عوارض جانبی سیپروفلوکساسین

تهوع، استفراغ ، اسهال، درد معده؛

خارش واژن

سردرد

تست عملکرد غیر طبیعی کبد



✓ References

- ✓ ^ Jump up to: a b c Zhanel GG, Fontaine S, Adam H, Schurek K, Mayer M, Noreddin AM, Gin AS, Rubinstein E, Hoban DJ (2006). "A Review of New Fluoroquinolones : Focus on their Use in Respiratory Tract Infections". *Treatments in Respiratory Medicine*. 5 (6): 437–65. doi:10.2165/00151829-200605060-00009. PMID 17154673.
- ✓ ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n "Ciprofloxacin Hydrochloride". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 23 August 2015.
- ✓ ^ "Ciprofloxacin Hcl Drops". WebMD. 22 Feb 2018. Retrieved 22 Feb 2018.

- ✓ ^ Jump up to: a b c Heidelbaugh JJ, Holmstrom H (April 2013). "The perils of prescribing fluoroquinolones". The Journal of Family Practice. 62 (4): 191–7. PMID 23570031.

- ✓ ^ Jump up to: a b "Prescribing medicines in pregnancy database". Australian Government. 23 August 2015. Archived from the original on 8 April 2014.

- ✓ ^ Ball P (July 2000). "Quinolone generations: natural history or natural selection?". The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 46 Suppl T1: 17–24. doi:10.1093/oxfordjournals.jac.a020889. PMID 10997595.

داکسی سایکلین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک است

این برای درمان عفونت هایی مانند عفونت های قفسه سینه ، عفونت های پوستی، روده بزرگ ، و همچنین بسیاری از عفونت (STIs) عفونت های دندانی و عفونت های منتقله از راه جنسی های نادر دیگر و اسهال عفونی استفاده می شود

برای اکثر عفونت ها، در چند روز عفونت را برطرف میکند ولی باید تا پایان دوره مصرف شود شایع ترین عوارض جانبی داکسی سایکلین سردرد، احساس یا بیماری است. همچنین می تواند پوست شما را به خورشید حساس کند

داکسی سایکلین می تواند رشد دندان ها را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین برای کودکان زیر 12 سال یا زنان باردار و شیرده نباید مصرف شود در طول مصرف داکسی سایکلین، الکل مصرف نکنید.

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

دوز معمول 100 تا 200 میلی گرم یک یا دو بار در روز است

برای جلوگیری از مالاریا، 100 میلی گرم یکبار در روز، معمولاً صبح می شود.

شما باید ابتدا داکسی سیکلین را قبل از رفتن به ناحیه ای که مالاریا وجود دارد، مصرف کنید

عوارض جانبی رایج

این عوارض جانبی رایج در حدود 1 در 10 نفر اتفاق می افتد.

سر درد

احساس یا بیماری (تهوع یا استفراغ)

حساسیت به نور خورشید



✓ **References**

- ✓ **^ Jump up to: a b Hamilton, Richard J. (2014). Tarascon pharmacopoeia (15 ed.). Jones & Bartlett Publishers. p. 85. ISBN 978-1-284-05671-6. Archived from the original on 8 September 2017.**
- ✓ **^ Jump up to: a b "Ciprofloxacin". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 24 August 2015.**
- ✓ **^ Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, O'Neill PJ, Chow AW, Dellinger EP, Eachempati SR, Gorbach S, Hilfiker M, May AK, Nathens AB, Sawyer RG, Bartlett JG (January 2010).**

- ✓ **"Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America". Clinical Infectious Diseases. 50 (2): 133–64. doi:10.1086/649554. PMID 20034345.**

- ✓ **^ Jump up to: a b Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Çek M, Naber KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F, Wullt B (2013). "Guidelines on Urological Infections" (PDF). European Association of Urology. Archived from the original (PDF) on 31 December 2013.**

اریترومایسین



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

اریترومایسین یک آنتی بیوتیک است

این به طور گسترده ای برای درمان عفونت های قفسه سینه مانند پنومونی ، مشکلات پوستی مانند آکنه و روده ، آبسه های دندانی و عفونت های منتقله از راه جنسی استفاده می شود

اریترومایسین در کودکان استفاده می شود، اغلب برای درمان عفونت های گوش یا عفونت های قفسه سینه

اریترومایسین را 2 تا 4 بار در روز طبق تجویز پزشک خود تجویز کنید

برای اکثر عفونت ها، باید ظرف چند روز احساس بهبودی کنید

برای شرایط پوستی مانند آکنه ممکن است چند ماه طول بکشد

اریترومایسین برای افراد خاص مناسب نیست

واکنش آلرژیک به اریترومایسین یا سایر آنتی بیوتیکها در گذشته داشته است

یک اختلال خون نادر، ارثی به نام پورفیری است

مشکلات کبدی یا کلیوی

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

قبل از مصرف آنتی بیوتیک اسهال دارید

ضربان قلب سریع، تپش یا بی نظیر

یک عفونت منتقله از طریق جنسی به نام سیفلیس و شما باردار هستید

عوارض جانبی رایج

احساس تهوع (تهوع)

بیماری (استفراغ) و اسهال

گرفتگی معده

از دست دادن اشتها

نفخ و سوء هاضمه

عوارض جانبی جدی



✓ **References**

- ✓ ^ Jump up to: a b "Prescribing medicines in pregnancy database". Australian Government. August 23, 2015. Archived from the original on April 8, 2014.
- ✓ ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k "Erythromycin". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 2015-09-06. Retrieved Aug 1, 2015.
- ✓ ^ Camilleri M, Parkman HP, Shafi MA, Abell TL, Gerson L (Jan 2013). "Clinical guideline: management of gastroparesis". The American Journal of Gastroenterology. 108 (1): 18–37, quiz 38. doi:10.1038/ajg.2012.373. PMC 3722580. PMID 23147521.

- ✓ ^ Matejcek A, Goldman RD (Nov 2013). "Treatment and prevention of ophthalmia neonatorum". *Canadian Family Physician*. 59 (11): 1187–90. PMC 3828094. PMID 24235191.
- ✓ ^ Jump up to: a b c Hamilton RJ (2013). *Tarascon pocket pharmacopoeia (2013 delux lab-coat ed., 14th ed.)*. [Sudbury, Mass.]: Jones & Bartlett Learning. p. 72. ISBN 9781449673611.
- ✓ ^ Kong YL, Tey HL (June 2013). "Treatment of acne vulgaris during pregnancy and lactation". *Drugs*. 73 (8): 779–87. doi:10.1007/s40265-013-0060-0. PMID 23657872.

مترونیدازول



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

مترونیدازول یک آنتی بیوتیک است

این برای درمان عفونت های پوستی، عفونت های روده ای و دهان (از جمله لثه های آلوده و آبسه های دندانی) مورد استفاده قرار می گیرد.

این در درمان شرایطی مانند واژینوز باکتریایی و بیماری التهابی لگنی و اسهال استفاده می شود

همچنین برای درمان نیش حشرات آلوده، زخم های پوستی، زخم های بستر و زخم، و برای درمان و جلوگیری از عفونت های باکتریایی و انگلی استفاده می شود

مترونیدازول تنها با نسخه قابل دسترس است

قرص مترونیدازول، مایعات و شیاف برای تعدادی از عفونت ها، از جمله بیماری التهابی لگنی تجویز می شود. فرم تجویز شده توسط پزشک، دوز و مدت زمان لازم برای مصرف دارو بستگی به نوع عفونت و اینکه چقدر جدی است

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

برخی از عفونت ها را می توان با یک دوز درمان کرد، در حالی که دیگران ممکن است یک دوره 2 هفته ای نیاز داشته باشند. دوز کودکان پایین تر است و بستگی به سن یا وزن فرزند شما دارد. دستورالعمل های پزشک یا داروساز خود را دنبال کنید

پس از غذا خوردن، قرص های مترونیدازول را باید با آب نوشیدنی فرو برد

نحوه استفاده از آن

دستورالعمل هایی را که در بسته بندی همراه با داروی شما آمده است دنبال کنید. این ها به شما می گویند که چگونه باید ژل را پر کنید و آن را به مهبل (واژن) خود اضافه کنید

هنگام استفاده از ژل واژینال، رابطه جنسی نداشته باشید

هنگام مصرف قرص یا مایع و یا استفاده از ژل واژینال یا شیاف، الکل مصرف نکنید. این می تواند به شما عوارض جانبی شدید مانند احساس و یا بیماری، درد معده، فلاشینگ، ضربان قلب تپش قلب (تپش قلب) و سردرد می دهد. پس از اتمام درمان، 2 روز قبل از مصرف الکل صبر کنید. این اجازه می دهد مترونیدازول بدن خود را ترک کند



✓ **References**

✓ ^ Jump up to: a b c d e f g "Flagyl, Flagyl ER (metronidazole) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more". Medscape Reference. WebMD. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 3 April 2014.

✓ ^ Jump up to: a b c d e Brayfield, A, ed. (14 January 2014). "Metronidazole". Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press. Retrieved 3 April 2014.

✓ ^ Jump up to: a b c d e f g h i "Metronidazole". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on September 6, 2015. Retrieved July 31, 2015.

- ✓ ^ Jump up to: a b c McDonald, LC; Gerding, DN; Johnson, S; Bakken, JS; Carroll, KC; Coffin, SE; Dubberke, ER; Garey, KW; Gould, CV; Kelly, C; Loo, V; Shaklee Sammons, J; Sandora, TJ; Wilcox, MH (15 February 2018). "Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)". *Clinical Infectious Diseases*. doi:10.1093/cid/cix1085. PMID 29462280.
- ✓ ^ Jump up to: a b "Metronidazole Use During Pregnancy | Drugs.com". www.drugs.com. Archived from the original on 1 January 2017. Retrieved 1 January 2017.

- ✓ ^ Corey, E.J. (2013). Drug discovery practices, processes, and perspectives. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. p. 27. ISBN 9781118354469. Archived from the original on 2017-09-08.

- ✓ ^ "WHO Model List of Essential Medicines (19th List)" (PDF). World Health Organization. April 2015. Archived (PDF) from the original on 13 December 2016. Retrieved 8 December 2016.

وانکومايسين



دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

وانکومایسین یک آنتی بیوتیک است. هنگامی که مصرف میشود، با باکتری ها در روده مبارزه می کند

وانکومایسین برای درمان عفونت روده ای ناشی از

Clostridium difficile

است که می تواند باعث اسهال آب ریزش یا خونریزی شود.

همچنین برای درمان عفونت های استافیلوکوک که می تواند باعث التهاب روده بزرگ و روده کوچک شود استفاده می شود

وانکومایسین خوراکی تنها در روده کار می کند و عفونت های دیگر را در سایر قسمت های بدن درمان نمی کند.

پیروی از تمام دستورالعمل ها در مورد برچسب دارو و بسته بندی خود را دنبال کنید.

هر یک از متخصصان مراقبت های بهداشتی خود را در مورد تمام شرایط پزشکی، آلرژی و تمام داروهای مورد استفاده خود بگویید

وانکومایسین می تواند باعث کاهش شنوایی موقت یا دائمی شود. متوقف کردن استفاده از این دارو و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید

اگر در معرض مشکلات شنوایی یا زنگ در گوش شما باشید

دانشنامه 8 آنتی بیوتیک مناسب برای اسهال

عوارض جانبی وانکومایسین

در صورت وجود هر یک از این علائم واکنش آلرژیک به ونکوماسین، کمک بگیرید.

تنفس سخت؛

تورم چهره،

لب ها، تورم

زبان یا گلو تورم

افت شنوایی، زنگ در گوش شما؛

مشکلات کلیوی

پتاسیم کم - سردرگمی، ضربان قلب ناخوشایند

برای اطمینان از اینکه این دارو باعث ایجاد اثرات مضر نمی شود، شنوایی شما به طور منظم

باید آزمایش شود. به طور منظم دکتر خود را ببینید



✓ **References**

✓ ^ **"Vancomycin". Merriam-Webster Dictionary.**

✓ ^ **"vancomycin - definition of vancomycin in English from the Oxford dictionary". OxfordDictionaries.com. Retrieved 2016-01-20.**

✓ ^ **Jump up to: a b c d e f g h i j "Vancocin". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 2015-09-06. Retrieved Sep 4, 2015.**

- ✓ ^ Liu, C; Bayer, A; Cosgrove, SE; Daum, RS; Fridkin, SK; Gorwitz, RJ; Kaplan, SL; Karchmer, AW; Levine, DP; Murray, BE; J Rybak, M; Talan, DA; Chambers, HF (1 February 2011). "Clinical practice guidelines by the infectious diseases society of america for the treatment of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections in adults and children: executive summary". *Clinical Infectious Diseases*. 52 (3): 285–92. doi:10.1093/cid/cir034. PMID 21217178.

- ✓ ^ Jump up to: a b c Hamilton, Richart (2015). *Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition*. Jones & Bartlett Learning. p. 91. ISBN 9781284057560.

- ✓ ^ "Prescribing medicines in pregnancy database". Australian Government. September 2015. Archived from the original on 2014-04-08.

- ✓ ^ "Vancomycin use while Breastfeeding". Archived from the original on 7 September 2015. Retrieved 5 September 2015.

- ✓ ^ Oxford Handbook of Infectious Diseases and Microbiology. OUP Oxford. 2009. p. 56. ISBN 9780191039621. Archived from the original on 2015-11-24.